

Els Bolets

De les Illes Balears



Lactarius sanguifluus var. *violaceus*



Esclata-sang, pebràs

Espècie que creix a garrigues i pinars, especialment en terrenys calcaris. Apareix durant tota la tardor i començament d'hivern. En rompre la seva carn, segrega un làtex vermellós.



Hohenbuehelia geogenia



Gírgola de pi, gírgola de carboner

Creix formant grups. El seu peu és reduït i les làmines blanques contrasten amb el color castany fosc del capell. És sàpròfit de troncs i arrels de pi.



Cantharellus alborufescens



Picornell groc, picornell, cama-seca, espicatormell

Creix a pinars i alzinars. No té vertaderes làmines. En el seu lloc hi té sèries de plects. Quan es toca es torna marró rogenc.



Tricholoma gausapatum



Gírgola d'estepa, fredolic, negret, fraret

Característica olor farinosa. El capell és pelut i de color negre grisenc, recordant el pelatge d'una rata. Creix formant simbiosi amb les estepes, intercanviant nutrients.



Hydnum albidum



Picornell blanc, picornell pelut

Forma grups nombrosos d'individus. En lloc de làmines presenta agullons característics. El trobam a pinars i també a garrigues en terrenys calcaris.



Russula delicata



Cogoma forta, esclata-sang blanc, esclata-sang d'alzina

Aquest bolet, amb el peu petit i rabassut, creix soterrat entre la fullaraca dels alzinars. La seva carn és trencadissa i la coloració general és sempre blanquinosa.



Laetiporus sulphureus



Gírgola de garrover

Creix com a paràsit sobre troncs de garrovers, ametllers i altres arbres. És un indicador de les pluges. Forma grups de bolets que creixen directament sense peu. No té làmines, i en el seu lloc presenta porus molt petits.



Agroclype aegerita



Gírgola de figuera, gírgola de poll

Creix formant grups a les parts mortes de la base dels troncs de figueres i polls. El peu és molt fibrós i les làmines són de color tabac. Sempre presenta anell.



Russula grisea & *Russula ilicis*



Blava, mare d'alzina, blaveta

La seva carn és trencadissa, recordant la textura del guix. Les dues espècies són difícils de diferenciar i creixen a alzinars. Les làmines són blanques o de color crema.



Clavulina cinerea



Peu de rata

Creix tant a pinars com a alzinars. La seva característica és la forma coral·loide que presenta, amb moltes ramificacions. És de color grisenc.



Helvella lacunosa



Orella de llebre negra

És un bolet tardà, que apareix quan d'hivern ja ha arribat. Quant a forma, textura i mida és igual a l'orella de llebre blanca, diferenciant-se d'aquesta pel color negre del capell, entre d'altres coses. Creix també a les sègtes de carboner.



Helvella crispa



Orella de llebre blanca

És un bolet tardà, que apareix quan d'fred de l'hivern ja ha arribat. El seu té molts de soles i és de color blanc i el capell presenta una forma irregular que recorda una sella de muntar a cavall. Es troba a pinars i alzinars.



Amanita mairei



"Campanilles", cogomes, gogomes

Als pinars i boscos mixtos hi trobam aquest bolet. El marge del capell presenta estries. No té anell i disposa d'una volva a la seva base.




Boletus pulchrotinctus & *Boletus satanas*



Bolet del dimoni

En lloc de làmines, compta amb una textura esponjiforme vermellosa o ataronjada. El seu és gruixut i al tall o quan es toca virola ràpidament a blau intens. Capell gros i arrodonit de color de blanc a rosat. Es troben a alzinars.



Omphalotus olearius



Gírgola d'olivera

Creix parasitant i saprofitant sobre tot tipus d'arbres i arbusts. Els exemplars joves són bioluminiscent i en manipular-los els dits es taquen de color ataronjat. Les làmines són decurrents. Creix formant grups o flotes preferentment quan les temperatures són moderades.



Clitocybe dealbata



Bolet blanc

Les seves làmines són decurrents i la seva carn fa olor a farina. Creix a tot tipus de garrigues. També la trobam a zones rurals, horts i jardins.



Agaricus xanthodermus



Xampinyó pudent

Làmines rosades que es tornen purpúries. Coloració general blanca amb taques grogues, la carn al tall virola a groc viu sobre tot a la base del seu. Presenta anell i desprèn una olor a tintura de iode. Creix a vores de camins i a llocs degradats.



Lepiota cristata



Farinet

Bolet cosmopolita que creix gairebé per tot. Les làmines són blanques i l'anell es desprèn fàcilment. El capell porta escames. Emet una olor semblant al ferro banyat.



Inocybe rimosa



Capell fibril·lar i làmines de color tabac. Creix a pinars, alzinars i garrigues. És un bolet primerenc, apareix quan les temperatures ambientals encara són elevades. Emet una característica olor espermàtica.



Mycena pura



Espècie cosmopolita de la qual existeixen diferents varietats. La trobam gairebé per tot, en qualsevol hàbitat. És característica la seva olor a patata o rave cru.



Amanita pantherina



Pixacà

Les restes de ved que presenta en el capell formen escames cotonoses i blanques. Creix a alzinars. Les làmines són blavoses i sempre porta anell i volva.

Classificació dels Bolets



Comestible excel·lent



Comestible



Comestible (només ben cuinat)



Tòxic



Mortífer



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura i Pesca

www.caib.es

012 €